Contrôle Écho Doppler des angioplasties et des pontages artériels

JP Laroche

*Unité de Médecine Vasculaire
CHU Montpellier (Pr. Isabelle Quéré)*

3^{ème} Partie

***Attention aux problèmes
Infectieux
(Lavage mains, gants,
TEGADERM ou
BIOPSY BAG)***

Pontages périphériques veineux sous inguinaux

Pontage Veineux FP versus Pontage Prothétique

➤ Pontage Veineux

Perméabilité 2 ans équivalent

Perméabilité à 4 ans

> genou : 61%

< genou : 76%

➤ Pontage Prothétique

Perméabilité à 2 ans équivalent

Perméabilité à 4 ans

> genou : 38%

< genou : 54%

Veith FJ, JVS 1986

Perméabilité à 4 ans : 73%

Perméabilité à 4 ans

Dacron : 47%

PTFE : 54%

KumarKP, Int Angiol 1995

Pontage veineux	Perméabilité primaire à 5 ans (%)	Perméabilité secondaire + membre sauvé à 5 ans (%)
Surveillance clinique (222)	67	67 + 73
Surveillance par ED (317)	56	80 + 94 p < 0,02

Résultats sur la perméabilité primaire et secondaire + le sauvetage de membre de la surveillance intensive par ED/clinique des ponts veineux sous inguinaux (*Bergamini et Al) Dehant V et Saby JC STV 1999.*

ED +++++

ACOMI et Pontage Veineux fémoro poplitée ED au décours de l'hospitalisation

➤ Contrôle J4/J8

Clinique

ED : recherche complications :

- * Hématome
- * Lymphocèle

ED : perméabilité

- * Diamètre
- * VSM étagées
- * IPS

ED : recherche TVP

ED de sortie = examen de référence pour le suivi

ACOMI et Pontage Veineux fémoro poplitée ED de surveillance

➤ Littérature

Kirby PL : Vein graft surveillance trial (1200 patients, J30, M3,6,9,12,18, 50 centres, résultats en attente , étude randomisée , **surveillance clinique versus Duplex** (EJVES 1999)

Golledge J (EJVS 1996)
2680 patients **surveillance ED** et 3969 **surveillance clinique** : décès, pontage occlus à J30 > dans le groupe clinique, mais nombre d'amputation identique.

➤ Conclusion

Surveillance Écho Doppler des pontages est nécessaire et validé y compris sur le plan du coût , **ED est supérieur à la clinique + IPS.**

Visser K (J Vasc Surg 2001), dans sa série le suivi ED permet d'éviter **6** amputations majeurs pour **1000** patients examinés

ACOMI et Pontage Veineux fémoro poplitée

ED de surveillance

➤ Quels paramètres ED ?

Gibson KD (J Vasc Surg 2001)

RV = > 3,5 + VSM < 50 cm/sec sont les meilleurs tests prédictifs d'occlusion. L'incidence de thrombose avec RV < 3,5 et VSM > 50 cm/sec est de 2,9%/an.

Incidence de thrombose avec RV > 3,5 (7%/an) et VSM < 50 cm/sec (6,5%/an).

Idu MM (J Vasc Surg 1998), le **RV** identifie les sténoses > 70% s'il est > 3 (Sens 80%, Spécif 84%)

Bandick (J Vasc Surg 1994)

recommande de traiter toutes les sténoses avec VSM > 300 cm/sec avec RV > 3,5 et des VSM dans le pontage < 45 cm/sec

➤ Démarche consensuelle

Rythme des contrôles : M3 ou M6, M12, M18 puis 1/an

Paramètres ED : VSM et RV

* VSM < 50 cm/sec doit faire rechercher une sténose

(S indirect)

* VSM normale entre 50 et 150 cm/sec

* RV quantifie la sténose, > 3 ou 3,5 = sténose > 70%

* Les sténoses siègent le plus souvent sur l'anastomose distale (Sonde basse fréquence, Doppler puissance).

* l'ED doit préciser **le diamètre de la veine et la longueur de la sténose.**

Diamètre du pontage veineux et critères de sténose, VSM dans le pontage

- Le diamètre d'un pontage veineux est compris entre 4 et 7 mm de diamètre, 5 en moyenne.
- **Ce diamètre influe de manière évidente sur les VSM étagées dans le pontage.**
- Ainsi le critère de 50 cm/sec (signe indirect) dans le pontage est à moduler avec ce diamètre :
 - * $VSM < 50$ cm/sec, pontage à diamètre important (7 mm), n'est pas forcément synonyme de dégradation du pontage.
 - * $VSM < 50$ cm /sec, pontage de faible diamètre (4 / 5mm) , dégradation probable

< 50%	45 < VSM < 150 1,5 < RV < 2
> 50 %	VSM > 200, 250 2 < RV < 2,5
> 70 %	VSM > 350, 400 3,5 < RV < 4
Occlusion	No signal

X2

X3

VSM : cm/sec, RV
VSM Sténose / VSM aval

ANAES, Juin 2002

Duplex Velocity criteria for stenosis repair

PSV max > 300 cm/sec

$V_r = \text{PSV}_{\text{max}} / \text{PSV}_{\text{prox}} > 3,5$

Bandyk DF, in Introduction to vascular, Ultrasonography, Zwiebel WJ, Pellerito JS, 2005, Ed Elseviers

Bandyk DF, in Introduction to vascular, Ultrasonography, Zwiebel WJ, Pellerito JS, 2005, Ed Elseviers

Duplex Follow up : Infra inguinal Vein Graft (In situ)

Table III. Abnormalities detected during surveillance for 462 saphenous vein in situ bypasses from 1981 to 1994

<i>Abnormality</i>	<i>No. of grafts (%)</i>
Stenosis (high flow velocity)	167 (37%)
Low flow velocity	100 (22%)
Decreased ABI or TP	83 (18%)
Arteriovenous fistula	47 (10%)
Graft thrombosis	39 (9%)
Retained valve	7 (1.5%)
Aneurysm	3 (1%)
Pseudoaneurysm	3 (1%)
Distal disease	1 (0.5%)
Total	450

ABI, Ankle/brachial index; *TP*, toe pressure.

Curtis A. Erickson, JVS 1996
Brian L. Ferris, JVS 2003

**Duplex – detected
graft stenosis**

**PSV > 300 cm/sec
PSV R > 3,5
ABI fall > 0,2**

+/- Artériography

**REPAIR
STENOSIS**

**Return to start
protocol**

**Duplex – detected
graft stenosis**

**200 < PSV < 300
2 < PSV R < 3,5
ABI Normal
or unchanged**

**Surveillance
every 4 / 6 weeks**

**10 / 20% of lesions
Remain stable**

**3 month
Scan interval**

*Bandyk DF
in Introduction to vascular
Ultrasonography, Zwiebel WJ,
Pellerito JS, 2005, Ed Elseviers*

**Lesion PSV decrease
To < 200 cm/sec**

**Resume 6 month
Surveillance
schedule**

Risk Stratification for Graft Thrombosis Based on Surveillance data

Category	High Velocity criteria	Low Velocity criteria	ABI, variation
1. High Risk	PSV > 300 or Vr > 3,5	< 45 cm/sec	> 0,15
2. High Risk	PSV > 300 or Vr > 3,5	> 45 cm/sec	< 0,15
3. Intermediate Risk	180 < PSV < 300 or Vr > 2	> 45 cm/sec	< 0,15
4. Low Risk	PSV < 180 or Vr < 2	> 45 cm/sec	< 0,15

Bandyk DF, in Introduction to vascular, Ultrasonography, Zwiebel WJ, Pellerito JS, 2005, Ed Elseviers

**Implication de l'ED dans la décision thérapeutique
lors de sténoses des pontages veineux fémoro poplités**
**Roth SM, Bandick DF, protocole University of south
Florida, www.med.usf.edu (1999)**

Duplex Follow up : The Vein Graft Trial

- **Objectives** : to compare the amputation rates, quality of life and health care costs in patients receiving duplex ultrasound scanning against clinical surveillance following femoropopliteal and femorocrural vein bypass.
- **Design** multi-centre, prospective, randomised controlled trial.
- **Methods** 1200 patients with a patent vein graft at 30 days postoperatively will be randomised to either clinical or duplex follow-up.
- **Results** : 594 patients, 290 (Clinical + ABI), 304 (Clinical +Duplex + ABI), Follow up 18 mois. *No difference between the 2 groups : amputation risk, new intervention, quality of life, cost effectiveness....*
- *Duplex scan is not justified systematically....*
- *But its seems to be usefuff for the follow up of by femoro poplital by pass after ischemia.*
- *Clinical data + ABI = gold standard, Duplex scan is a good alternative, in several cases .*

*Kirby PL, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery
Volume 18, 1999 , 469-474*

Davies AH, Br J Surg 2004;91:1077-88

The Vein Graft Trial : Résultats

(3a) Primary patency

(3b) Primary assisted patency

(3c) Secondary patency

The Vein Graft Trial : Résultats

TABLE 5. Quality-of-Life Assessments at 6 and 18 Months* and Health Service Costs Over 18 Months

	No. of Patients	Clinical Follow-Up	Duplex Follow-Up	P†
6-Month outcomes				
SF-36 physical score	447	47±27	50±30	0.19
SF-36 mental score	439	71±20	71±21	0.93
EQ5D utility score	443	0.59±0.30	0.63±0.30	0.06
18-Month outcomes				
SF-36 physical score	351	48±29	50±28	0.51
SF-36 mental score	352	71±21	74±21	0.15
EQ5D utility score	375	0.62±0.29	0.64±0.29	0.28
Health service costs over 18 months				
Cost per patient (£) (median)	594	876±2035 (111)	1371±1837 (666)	0.002

Values are mean±SD except where indicated.

*Higher SF-36 and lower EQ5D scores each represent worse perceived health.

†P values from Mann-Whitney test for quality-of-life scores and from *t* test for costs.

Justifications surveillance

➤ PONTAGES VEINEUX :

- 1 pontage sur 2 thrombosé à 2 ans si sténose > 50%

- Tous thrombosés à 2 ans si sténose > 70%

- 80% thrombosés à 4 mois si sténose « critique »

(RVS>4)

ATL

Pontage veineux fémoro poplité

FC

V = 0.92m/s
MOY = 0.69m/s
d DP= 8mm

Insertion distale

Dist: 5.2mm

Dist: 4.5mm

IR: Vs: 155.6cm/s Vd: cm/s
S/D:

7.98

E77

100%

77/78
13Hz

PONT INSERTION DISTALE

6.00M P3.5 G61 C16 A2

HDI
5000

U OF W / VASC. RESEARCH

L7-4 PVasc/Graft

12:04:35 pm

TIs 0.1 MI 0.48

Fr #470 3.0 cm

Map 2
170dB/C 2
2D Opt:FSCT
SonoCT™
XRES™

GRAFT TO ANTERIOR TIBIAL ARTERY ANASTAMOSIS
PANORAMIC SonoCT™ IMAGING WITH XRES™ TECHNOLOGY

HDI
5000

L12-5 50 PVasc/Graft

7:16:44 am

TIs 0.1 MI 0.26
Fr #112 2.6 cm

Col 66% Map 1
WF Low
PRF 2000 Hz
Flow Opt: Med V

SV Angle -60°
Dep 1.1 cm
Size 1.5 mm
Freq 6.0 MHz
WF Low
Dop 61% C 3
PRF 14286Hz

14/16
4/1
4/1
50/1
3/ 72

C37-4.4
CD-3.0
9Hz

5.5k
31mm
63°

0
6/ 9
43/16
4/0
4/1
50/1
3/ 70
8.0cm

V 2.47m/s
GP 24.5mmHg
5.5kT

ACOMI et Pontage Veineux in situ fémoro poplité ED au décours de l'hospitalisation

➤ Contrôle J4/J8

Clinique

ED : recherche

complications :

- * Hématome
- * Lymphocèle

ED : perméabilité

- * **FAV +++++**
- * Diamètre
- * VSM étagées
- * IPS

ED : recherche TVP

ED de sortie = examen de référence pour le suivi

Table 13. Surveillance Program for Infrainguinal Vein Bypass Grafts

Patients undergoing vein bypass graft placement in the lower extremity for the treatment of claudication or limb-threatening ischemia should be entered into a surveillance program. This program should consist of:

- Interval history (new symptoms)
- Vascular examination of the leg with palpation of proximal, graft, and outflow vessel pulses
- Periodic measurement of resting and, if possible, postexercise ABIs
- Duplex scanning of the entire length of the graft, with calculation of peak systolic velocities and velocity ratios across all identified lesions

Surveillance programs should be performed in the immediate postoperative period and at regular intervals for at least 2 years

- Femoral-popliteal and femoral-tibial venous conduit bypass at approximately 3, 6, and 12 months and annually

Adapted from *J Vasc Surg*, 31, Dormandy JA, Rutherford RB, for the TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC) Working Group, Management of peripheral arterial disease (PAD), S1–S296, Copyright 2000, with permission from Elsevier (16).

ABI = ankle-brachial index.

***Recommendations AHA 2005
Circulation 2006***

FIDT
5000

Duke Univ. Medical Center

CL15-7 PVasc/Graft

1:10:48 pm

TIs 0.0 MI 0.37
Fr #470 2.4 cm

Map 2
170dB/C 3
2D Opt:FSCT
SonoCT™

LOWER EXTREMITY INSITU GRAFT
PANORAMIC SonoCT™ IMAGING

HDI
5000

U OF W / VASC. RESEARCH

L12-5 50 PVasc/Graft

10:14:57 am

TIs 0.0 MI 0.55
Fr #234 3.0 cm

C 2

170dB/C 3

Persist Off

2D Opt:FSCT

Fr Rate:Surv

SonoCT™

XRES™

VEIN PATCH GRAFT ANASTAMOSIS WITH THROMBUS

SonoCT™ IMAGING WITH XRES™ TECHNOLOGY

Pontages périphériques prothétiques sous inguinaux

ACOMI et Pontage prothétique fémoro poplité : ED au décours de l'hospitalisation

➤ **Contrôle J4/J8**

Clinique

ED : recherche

complications :

- * **Hématome**
- * **Lymphocèle**
- * **Sérome péri**

prothétique

ED : perméabilité

- * **VSM : ?**
- * **IPS**

ED : recherche TVP

**ED de sortie = examen
de référence pour le
suivi**

ACOMI et Pontage prothétique fémoro poplité : ED de surveillance

- **Perméabilité**
- **Faux anévrisme (complication tardive)**

**FC droite
Pont FP**

Prothèse

← Veine

SEROME

1.3

F55

PONT
PROTHETIQUE
FEM POP

100%

55/62
13Hz

6.00M P5.0 G53 C16 A2

ALOKA

SEROME

: A

05-10-'09
16:53:42

100%

5.00M
27Hz
G53
C16

1:T.S.A.

Sonde:LINEAIRE

SEROME

***Pontage prothétique fémoro poplité
Alluvionnage***

Coût de la surveillance Echo Doppler des pontages veineux fémoro poplités

Table VI. Cost-benefit analysis of an intensive surveillance program versus revision for clinical indication

	Intensive surveillance (n = 150)*	Clinically indicated revision (n = 222)††
No. of grafts revised (%)	58 (37)	34 (13)
Revision before thrombosis	46 (29)	9 (4)
Revision after thrombosis	12 (8)	25 (9)
Cumulative graft patency (%)		
1 y	91	84
5 y	82	67
Limb salvage (%)		
1 y	96	83
5 y	92	73
Estimated cost per graft (\$)		
1 y	7,742	10,842
5 y	12,194	16,352

Wixon CL, JVS 2000

En pratique....

Quitting smoking, a healthy diet and exercise may reduce your risk of heart disease

Plaque in coronary artery

ADAM

Duplex Scan

PTA Procedure

Patency
PSV
Vr
ABI
Runoff

Aorto/Iliac/Femoral Bypass Graft

Patency
PSV
Vr
ABI
Anastomosis
Runoff

Infra inguinal Bypass Graft (Vein /Prothetic graft)

Patency
Diameter
PSV
Vr
Low Velocity
ABI
Anastomosis
Runoff

Conclusions 1

- Surveiller et contrôler par ED une angioplastie ou un pontage veineux ou prothétique est un examen pour lequel les bases classiques de l'ultrasonologie s'appliquent sans variation particulière mais l'angiologue doit être entraîné pour ce type de surveillance .
- Les critères prédictifs de dégradation des pontages obéissent aux lois habituelles de l'hémodynamique
- Il faut savoir se donner les moyens de réaliser cet examen avec les bons outils : sonde de basse fréquence, doppler puissance....
- Il faut TOUJOURS disposer du CR opératoire
- Il faut TOUJOURS faire référence aux données de la clinique
- Il faut savoir synthétiser l'ensemble des données hémodynamiques, anatomiques et cliniques.
- Il faut savoir aussi poser l'indication d'un examen complémentaire : **angiographie, angio IRM , angio Scanner**, qui s'ils sont guidés par l'ED pour les cas difficiles, voient leur rendement informatif considérablement accru.
- Il faut une équipe « convaincue »

Conclusions 2

- Surveillance Echo Doppler utile et fiable dans les pontages veineux
- Matériel adapté Echo Doppler + Jeu de sondes
- Médecins Vasculaires entraînés, méthodologie rigoureuse
- Chirurgiens convaincus

Bibliographie 2011

COME UP TO
NEW KOOL BOX

KOOL
Filters
MENTHOL

SURGEON GENERAL'S WARNING: Quitting Smoking Now Greatly Reduces Serious Risks to Your Health.

16 mg. "tar", 1.1 mg. nicotine av. per cigarette, FTC Report Feb. '85

"Light my Lucky."

LUCKY STRIKE
LIGHTS

©1997 Philip Morris Inc.

LE TABAC N'EST PAS UNE DROGUE!

C'EST CLAIR!

40 ANS QUE JE FUME
ET C'EST SEULEMENT
MAINTENANT QUE JE PLANE!